Żeby **wiedzieć,** trzeba **czytać**
www.agroprofil.pl

magazyn rolniczy
AgroProfil

+48 791 790 901 | +48 61 881 88 99 | agroprofil@agroprofil.pl

facebook.com/magazynrolniczy/ instagram/agro_profil YouTube Agro Profil znajdź nas również na

Słonecznik | ZAPRAWY

Zwalczanie	Produkt	Zawartość substancji czynnej	Dawka na 100 kg	Maks. dawka jednorazowa	Uwagi
Alternarioza słonecznika, szara pleśń słonecznika, zgnilizna twardzikowa słonecznika, zgorzel siewek	Maxim 025 FS	fludioksonil – 25 g/l	600 ml (900-1600 ml wody)	600 ml	

Słonecznik | HERBICYDY

Zwalczanie	Produkt	Zawartość substancji czynnej	Dawka na ha	Maks. dawka jednorazowa	Maks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (min. odstęp między zabiegami)	Karencja (dni)	Uwagi
BEZPOŚREDNIO PO SIEWIE							
chwastnica jednostronna, fiołek polny, komosa biała	Bandur 600 SC	aklonifen - 600 g/l	2,5- 3 l	3 l	1	nd	
chwastnica jednostronna, palusznik krwawy, psianka czarna, włośnica zielona	Dual Gold 960 EC Efica 960 EC	s-metolachlor – 960 g/l	1–1,25 l	1,25 l	1	nd	
dymnica pospolita, fiołek polny, gorczyca polna, gwiazdnica pospolita, jasnota purpurowa, komosa biała, krzywoszyj polny, maruna bezwonna, owies głuchy, poziewnik szorstki, przetacznik perski, rdest kolankowy, rdest ptasi, samosiewy rzepaku, starzec zwyczajny, szarłat szorstki, szczyr roczny (na dawkę 4 l/ha), tasznik pospolity, tobołki polne, wiechlina roczna, żółtlica drobnokwiatowa	Inigo 500 SC Proman 500 SC Soleto 500 SC	metobromuron – 500 g/l	2–3 l	3 l	1	nd	Środek stosować przed wzejściem rośliny uprawnej (BBCH 00–08), najlepiej w ciągu 5 dni po siewie zanim hypokotyl znajdzie się blisko powierzchni ziemi. Nie stosować na glebach suchych i zbrylonych jak również mokrych i zamulonych.
OOD FAZY DWÓCH LIŚCI DO FAZY CZTERECH LIŚCI (BBCH 12 - 14)							
chaber bławatek, maruna bezwonna, ostrożeń polny	Clap	chlopyralid – 300 g/kg	0,4 l	0,4 l	1	nd	
OD FAZY CAŁKOWICIE ROZWINIĘTYCH LIŚCIENI DO FAZY 6 LIŚCI (BBCH 10-16)							
samosiewy zbóż zwalczane wiosną, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica sina, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa	Achiba 05 EC Targa Super 05 EC	chizalofop-P-etylowy - 50 g/l	1,25 l	1,25 l	1	90	Nie stosować innego środka chwastobójczego w okresie 14 dni po wykonaniu zabiegu.
OD MOMENTU ROZWINIĘTEJ PIERWSZEJ PARY LIŚCI DO MOMENTU WYTWORZENIA PRZEZ ROŚLINĘ UPRAWNĄ SZÓSTEJ PARY LIŚCI (BBCH 12–16)							
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, włośnica zielona, wyczyniec, polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechliny	Fusilade Forte 150 EC	fluazyfop-P-butylowy – 150 g/l	0,6–2,5 l	2,5 l	1	90	Nie stosować gdy temperatura powietrza przekracza 27°C. Niższe dawki środka stosować we wcześniejszych fazach rozwojowych rośliny uprawnej.
samosiewy zbóż, chwastnica jednostronna, miotła zbożowa, owies głuchy, wyczyniec polny, życica wielokwiatowa, perz właściwy, wiechlina roczna	Trivko	fluazyfop-P-butylowy – 125 g/l	0,75–3 l	3 l	1		
owies głuchy, chwastnica jednostronna, samosiewy zbóż	Trivko Privium 125 EC	fluazyfop-P-butylowy – 125 g/l	0,75–1 l	1 l	1		
miotła zbożowa, wyczyniec polny			1 l	1 l			
perz właściwy			2 l	2 l			
OD FAZY ROZWINIĘTYCH DWÓCH LIŚCI (PIERWSZA PARA) DO FAZY 9. LIŚCIA SŁONECZNIKA (BBCH 12–19)							
chwasty jednoroczne	Focus Ultra 100 EC	cykloksydym – 100 g/l	1–2 l	2 l	1	35	W warunkach mniej sprzyjających działaniu herbicydu lub gdy chwasty są zaawansowane w rozwoju celem poprawienia skuteczności zabiegu można stosować środek Focus Ultra 100 EC łącznie z adiuwantem Dash HC w dawkach: 1,0 l/ha Focus Ultra 100 EC + 1,0 l/ha Dash HC (chwasty jednoroczne) lub 2 l/ha Focus Ultra 100 EC + 2 l/ha Dash HC (chwasty wieloletnie).
chwasty wieloletnie			4–5 l	5 l	1	35	
OD FAZY ROZWINIĘTEGO DRUGIEGO LIŚCIA WŁAŚCIWEGO DO POCZĄTKU WYDŁUŻANIA PĘDU (BBCH 12-30)							
prosowate, owies głuchy, samosiewy zbóż	Select Super 120 EC	kletodym – 120 g/l	0,8 l	0,8 l	1	120	
perz właściwy			2 l	2 l	1		
OD MOMENTU WYTWORZENIA TRZECIEGO LIŚCIA DO FAZY WIDOCZNYCH 9 LUB WIĘCEJ MIĘDZYWĘZLI (BBCH 13-39)							
chwastnica jednostronna, perz właściwy	Trepach	chizalofop-p-etylu - 50 g/l	0,4 - 3 l	3 l	1	60	
PO WSCHODACH ROŚLINY UPRAWNEJ I CHWASTÓW, NIEZALEŻNIE OD FAZY ROZWOJOWEJ ROŚLINY UPRAWNEJ							
wiechlina roczna, perz właściwy	Gallant Super 104 EC Perenal 104 EC	haloksyfop-P – 104 g/l	1 l	1 l	1	100	Środek można stosować nie częściej niż 1 raz na 2 lata. Temperatura działania: 8–27°C.

Słonecznik | FUNGICYDY

Zwalczanie	Produkt	Zawartość substancji czynnej	Dawka na ha	Maks. dawka jednorazowa	Maks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (min. odstęp między zabiegami)	Karencja (dni)	Uwagi
Zgnilizna twardzikowa	Amistar Gold	azoksystrobina - 125 g/l difenokonazol - 125 g/l	1,0 l	1,0 l	1		Środek zastosować zapobiegawczo, w fazach BBCH 59-69 od końca fazy rozwoju kwiatostanu (kwiatostan ciągle zamknięty) do końca fazy kwitnienia (większość kwiatów przekwita, a kwiaty brzeżne opadają).
Zgnilizna twardzikowa, szara pleśń	Propulse 250 SE	fluopyram – 125 g/l protiokonazol –125 g/l	1 l	1 l	2 (14 dni)	28	Środek stosować od fazy 6 liścia do fazy końca fazy kwitnienia: większość kwiatów przekwitła, brzeżne kwiaty zasychają i opadają (BBCH 16-69).

Słonecznik | REGULATORY I STYMULATORY

Zwalczanie	Produkt	Zawartość substancji czynnej	Dawka na ha	Maks. dawka jednorazowa	Maks. liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym (min. odstęp między zabiegami)	Karencja (dni)	Uwagi
Wpływ na wyższe plonowanie oraz polepszenie jakości plonów	Asahi SL	para-nitrofenolan sodu – 3g/l orto-nitrofenolan sodu – 2 g/l 5-nitrogwajakolan sodu – 1 g/l	0,6 l	0,6 l	2 (10–21 dni)	30	Środek Asahi SL stosować od fazy rozwiniętych dwóch liści właściwych do momentu, gdy płatki kwiatów są widoczne między przylistkami, ale kwiatostany są nadal zamknięte.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa i przy podejmowaniu decyzji o zastosowaniu środka bezwzględnie zapoznać się z etykietą dołączoną do preparatu, dostępną także na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi